

# PENETAPAN KADAR FENOLIK TOTAL DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL DAUN KOPI KAWA DENGAN METODE DPPH

*By HARI SUSANTI*

1

**PENETAPAN KADAR FENOLIK TOTAL DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL DAUN KOPI KAWA DENGAN METODE DPPH**

3

**DETERMINATION OF TOTAL PHENOLIC CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF KAWA COFFEE LEAVES ETHANOLIC EXTRACT WITH DPPH METHOD**

Aprilia Kusbandari\*, Dwi Yogo Prasetyo, Hari susanti

Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

Jl. Prof. Dr. Soepomo Janturan Umbulharjo Yogyakarta 55164

\*Penulis Korespondensi, email: [kusbandari80@yahoo.com](mailto:kusbandari80@yahoo.com)

**ABSTRAK**

1

Antioksidan merupakan senyawa yang mampu menghambat laju oksidasi dalam tubuh. Antioksidan sintetik dapat menimbulkan efek samping pada kesehatan tubuh sehingga penggunaan antioksidan alami sebagai pengganti semakin diminati masyarakat karena dipercaya lebih aman. Salah satu golongan senyawa alami yang bersifat sebagai antioksidan adalah golongan fenolik. Daun kopi kawa mengandung flavonoid, alkaloid, saponin, kafein, dan polifenol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar fenol total dan harga *Effective Scavenging* (ES)<sub>50</sub> ekstrak etanol daun kopi kawa. Daun kopi kawa diekstraksi menggunakan metode maserasi. Ekstrak kental diuji kandungan fenoliknya dengan reagen Folin-Ciocalteu dan standar asam galat. Hasil uji kandungan fenolik total dinyatakan dengan kesetaraan asam galat per gram ekstrak (GAE/g ekstrak). Hasil penelitian menunjukkan ekstrak etanol daun kopi kawa memiliki kandungan senyawa fenolik total sebesar 55,87 mg GAE/g ekstrak. Ekstrak etanol daun kopi kawa memiliki aktivitas antioksidan dengan nilai ES<sub>50</sub> sebesar 57,79 µg/mL sedangkan untuk standar asam galat memiliki nilai ES<sub>50</sub> sebesar 1,54 µg/mL. Hasil tersebut menunjukkan ekstrak etanol daun kopi kawa memiliki aktivitas yang kuat sebagai antioksidan.

**Kata kunci:** antioksidan, daun kopi kawa, fenol total, DPPH

**ABSTRACT**

*Antioxidant is a compound which able to inhibit rate of oxidation in body. Synthetic antioxidants can cause side effects in health so the use of natural antioxidant as a substitute for become favorite one because trusted safer. Phenolic is one of natural compound that is as antioxidant. Leaves Kawa's coffee containing flavonoid, saponin, alkaloid, caffeine, and polyphenol. Research aims to identify the total phenol content and Effective Scavenging (ES)<sub>50</sub> of ethanol extracts leaves Kawa's coffee. Leaves kawa's coffee extracted uses the maceration. Viscous extract tested its phenolic content with Folin-Ciocalteu reagent and gallic acid standard. Test phenolic content total expressed by gallic acid equivalent per gram extract (GAE/ g extract).The results showed that kawa's coffee leaves*

*ethanolic extract has a total phenolic content is 55.870 GAE/g extract. Leaves kawa's coffee ethanolic extract has antioxidant activity with ES<sub>50</sub> is 57.972 µg/mL while for gallic acid standard has ES<sub>50</sub> is 1.537 µg/mL. The activit of antioxidant extract ethanolic of kawa's coffee leaves is strong.*

**Keywords:** antioxidants, kawa's coffee leaves, total phenol, DPPH

## PENDAHULUAN

Aktivitas antioksidan alami berasal dari metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, saponin, tannin dan lain-lain (Ketaren, 1986). Antioksidan golongan fenol memegang peranan penting dalam makanan. Daun kopi mengandung flavonoid, alkaloid, saponin, kafein, dan polifenol. Asam fenolik yang terkandung dalam daun kopi merupakan senyawa antioksidan yang dapat berfungsi menghilangkan radikal bebas di dalam tubuh (Wulandari, 2014).

Mengingat pentingnya fungsi senyawa fenolik sebagai antioksidan maka perlu dilakukan penetapan kadar fenolik total dalam daun kopi kawa. Penetapan kadar fenolik dapat dilakukan dengan menggunakan metode spektrofotometri visibel dengan pereaksi *Folin Ciocalteu* (Susanti dan Alfian, 2012). Selanjutnya dilakukan pengujian aktivitas antioksidan dapat menggunakan metode DPPH (1,1-Difenil-2-pikrhidrazil (Sashikumar *et al.*, 2009). Parameter yang diamati pada penelitian ini adalah nilai ES<sub>50</sub>.

## METODE PENELITIAN

### Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun kopi kawa dari Kabupaten Kerinci. etanol p.a (Merck), FeCl<sub>3</sub> p.a (Sigma), aquadest, NaCl 2%, gelatin 1%, ammonia 25%, kloroform, pereaksi Mayer dan Dragendorf, pereaksi *Folin-Ciocalteu* (Merck), asam galat (Sigma), aquadest bebas CO<sub>2</sub>, natrium bikarbonat (JT Baker), DPPH (Sigma-Aldrich).

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah timbangan analitik, pisau, *magnetic stirrer*, alat-alat gelas, pipet, seperangkat alat spektrofotometer UV-VIS pharmaspec UV-1700 Shimadzu.

### Jalannya Penelitian

#### Pembuatan Ekstrak

Sebanyak 300 gram serbuk daun kopi kawa direndam dengan etanol 96% sambil diaduk dengan stirrer selama 3 jam, setelah didiamkan selama 24 jam, disaring dengan corong *Buchner* dan filtrat yang diperoleh dipekatkan dengan *vacuum rotary evaporator*.

#### Uji Skrining Fitokimia

Uji senyawa polifenol (Harborne, 1987)

Sejumlah ekstrak dilarutkan dalam etanol kemudian ditambahkan pereaksi FeCl<sub>3</sub> sebanyak 3 tetes. Terjadinya warna hijau biru menunjukkan adanya polifenol.

**Uji senyawa flavonoid**

Sejumlah ekstrak masing-masing dilarutkan dalam etanol, kemudian diteteskan pada kertas saring. Kertas saring tersebut dilewatkan pada uap amonia. Apabila terbentuk warna kuning intensif maka positif mengandung flavonoid (Susanti & Alfian, 2012).

**Uji senyawa alkaloid**

Sejumlah ekstrak etanol daun kopi kawa dan standar asam galat masing-masing dengan 5 mL amoniak 25% dan digerus dalam mortir lalu ditambahkan 20 mL kloroform dan digerus kuat. Campuran disaring sehingga diperoleh lapisan air dan lapisan pelarut organik. Lapisan air ditambahkan 2 tetes pereaksi *Dragendorff* atau pereaksi *Mayer*. Jika terbentuk warna oranye dengan pereaksi *Dragendorff* atau terbentuk endapan putih dengan penambahan pereaksi *Mayer* berarti ekstrak mengandung alkaloid (Anonim, 1979).

**Uji senyawa tannin**

Sejumlah ekstrak etanol daun kopi kawa dan standar asam galat masing-masing dilarutkan dalam air suling dan dipanaskan selama 30 menit di atas penangas air, kemudian disaring. Filtrat ditambah larutan NaCl 2%; bila terjadi endapan, disaring melalui kertas saring. Filtrat ditambah larutan gelatin 1%; bila timbul endapan menunjukkan adanya tanin atau zat samak (Susanti & Alfian, 2012).

**Uji Pendahuluan****Uji Polifenol**

Sejumlah larutan uji dan standar asam masing-masing dimasukkan dalam tabung reaksi, kemudian ditambah dengan 1,5 mL reagen *Folin-Ciocalteu*. Campuran didiamkan selama 10 menit, lalu ditambah dengan 1,2 mL larutan natrium bikarbonat 1 M. Warna larutan diamati secara visual dengan mata (Susanti & Alfian, 2012).

**Uji Antioksidan**

Sebanyak 1,0 mL larutan DPPH dimasukkan ke dalam masing-masing tiga tabung reaksi, kemudian ke dalam masing-masing tabung reaksi ditambahkan etanol p.a, larutan pembanding asam galat, dan larutan uji kemudian diamati terjadinya perubahan warna menjadi kuning (Susanti & Alfian, 2012).

**Uji Fenol Total****Pembuatan Reagen**

Pembuatan larutan induk asam galat (1 mg/mL)

Ditimbang sebanyak 10,0 mg asam galat dimasukkan dalam labu takar 10 mL kemudian ditambahkan dengan 0,5 mL etanol p.a, kemudian diencerkan dengan akuades sampai tanda (Susanti & Alfian, 2012).

**Pembuatan larutan Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 7,5%**

Ditimbang sebanyak 7,5 gram Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> ditambahkan 80 mL akuades,

kemudian dididihkan sampai  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  larut sempurna. Setelah itu didiamkan selama 24 jam, disaring dan diencerkan dengan akuades sampai volume 100 mL (Susanti & Alfian, 2012).

#### Penentuan Kadar Fenol Total (Murtidjaya & Lim, 2007)

Penentuan kadar fenol diawali dengan penentuan *Operating time*, pencarian panjang gelombang maximum, pembuatan kurva baku asam galat, dan dilanjutkan dengan penetapan kadar fenolik total.

#### Uji Aktivitas Antioksidan

##### Pembuatan larutan DPPH 0,15 mM

Larutan DPPH 0,15 mM dibuat dengan cara melarutkan sebanyak 19,8 mg DPPH dalam etanol p.a hingga 50 mL, diambil 15 mL selanjutnya ditambahkan etanol p.a hingga 100 mL (Susanti & Alfian, 2012).

##### Pembuatan Larutan Induk Standar Asam Galat

Larutan induk dibuat dari 10,0 mg standar asam galat yang dilarutkan dalam etanol p.a. hingga 10 mL.

##### Penentuan Panjang Gelombang Serapan Maksimum

Larutan DPPH 0,15 mM sebanyak 1,0 mL ditambah dengan 1,0 mL etanol absolut p.a, kemudian diukur serapannya dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 400-800 nm sampai didapat grafik hubungan antara panjang gelombang vs serapan, dimana serapan tertinggi merupakan panjang gelombang serapan maksimum (Salamah *et al.*, 2015).

##### Pembuatan Larutan Kontrol Negatif

Kontrol negatif dibuat dari larutan DPPH 0,15 mM sebanyak 1,0 mL yang ditambah dengan 1,0 mL etanol absolut p.a. kemudian dibaca serapannya pada lamda gelombang maksimum yang didapat pada pengukuran sebelumnya.

##### Penentuan *Operating Time*

Masing-masing standar asam galat 2  $\mu\text{g}/\text{mL}$  dan larutan ekstrak etanol daun kopi kawa 1  $\text{mg}/\text{mL}$  dalam etanol p.a sebanyak 1,0 mL ditambah dengan 1,0 mL DPPH 0,15 mM, kemudian diukur serapannya pada panjang gelombang 517 nm selama 0-90 menit sehingga diperoleh waktu serapan yang stabil (Salamah *et al.*, 2015).

##### Penentuan Aktivitas Antioksidan

Masing-masing 1,0 mL larutan induk standar asam galat dengan konsentrasi 0,2; 0,6; 1; 1,4; 1,8; 2,2; 2,6 dan  $\mu\text{g}/\text{mL}$  larutan ekstrak etanol daun kopi kawa dengan konsentrasi 10; 20 ;30; 40; 50; 60; 70  $\mu\text{g}/\text{mL}$ , ditambahkan 1,0 mL larutan DPPH 0,15 mM. Campuran dihomogenkan dan didiamkan di tempat gelap sesuai dengan *operating time* yang diperoleh, kemudian serapan larutan sampel diukur dengan spektrofotometer *UV-Vis*.

#### Analisis Data

Analisis data untuk penentuan kandungan senyawa fenolik total dilakukan dengan metode kurva baku, regresi linier  $y = bx + a$  dibuat berdasarkan data

absorbansi dan konsentrasi dari larutan standar. Kemudian dihitung ekuivalensi asam galat (GAE). Aktivitas antioksidan dihitung berdasarkan persen penangkapan radikal dengan menggunakan rumus 1.

$$\% \text{ Penangkapan Radikal} = \frac{\text{Serapan kontrol} - \text{Serapan sampel}}{\text{Serapan kontrol}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(1)$$

Kemudian dilakukan regresi linier antara konsentrasi dengan %penangkapan sehingga didapat persamaan  $y = bx + a$  dimana  $y = 50$ , sehingga didapat nilai  $ES_{50}$ .

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada pembuatan ekstrak diperoleh rendemen ekstrak etanol daun kopi kawa sebesar 4,87%. Pada uji skrining fitokimia dilakukan untuk mengetahui senyawa yang terkandung dalam sampel ekstrak etanol daun kopi kawa. Skrining fitokimia yang dilakukan meliputi uji polifenol, flavonoid, alkaloid dan tannin. Hasil uji skrining fitokimia dapat dilihat pada Tabel I.

**Tabel I.** Hasil skrining fitokimia

No	Jenis Uji	Sebelum	Sesudah	Kesimpulan
1	Uji polifenol	Kuning	Biru kehijauan	Mengandung polifenol
2	Uji flavonoid	Kuning	Kuning intensif	Mengandung flavonoid
3	Uji alkaloid	Kuning	Merah	Sedikit mengandung alkaloid
4	Uji tanin	Kuning	Kuning	Tidak mengandung tanin

Penetapan kadar fenolik total menggunakan metode spektrofotometri visibel dengan pereaksi *Folin-Ciocalteau*. Digunakan pereaksi *Folin-Ciocalteau* dikarenakan senyawa fenolik dapat bereaksi dengan folin membentuk larutan berwarna biru yang dapat diukur absorbansinya pada panjang gelombang 765 nm. Prinsip metode *Folin-Ciocalteau* adalah oksidasi gugus fenolik hidroksil. Pereaksi ini mengoksidasi fenolat (garam alkali), mereduksi asam heteropoli menjadi suatu kompleks molybdenum-tungsten (Mo-W). Fenolat hanya terdapat pada larutan basa, tetapi pereaksi *Folin-Ciocalteau* dan produknya tidak stabil pada kondisi basa.

Selama reaksi berlangsung, gugus fenolik-hidroksil bereaksi dengan pereaksi *Folin-Ciocalteau*, membentuk kompleks fosfatungstat-fosfomolibdat berwarna biru dengan struktur yang belum diketahui dan dapat dideteksi dengan spektrofotometer. Warna biru yang terbentuk akan semakin pekat setara dengan konsentrasi ion fenolat yang terbentuk, artinya semakin besar konsentrasi senyawa fenolik maka semakin banyak ion fenolat yang akan mereduksi asam heteropoli sehingga warna biru yang dihasilkan semakin pekat (Singleton & Rossi, 1965).

Didapatkan hasil kadar fenolik total sebesar  $55,870 \pm 2,90$  g GAE/g ekstrak.

**Tabel II.** Hasil uji kualitatif ekstrak etanol daun kopi kawa

Sampel	Uji Kualitatif	Larutan sebelum reaksi	Larutan sesudah reaksi	Perubahan warna	Keterangan
Asam Galat	Uji Polifenol			Bening menjadi biru kehitaman	+
	Uji Kualitatif Antioksidan			Memudarkan warna ungu dari DPPH menjadi kuning	+
Ekstrak Etanol	Uji Polifenol			Kuning menjadi hijau	+
	Uji Kualitatif Antioksidan			Memudarkan warna ungu dari DPPH menjadi kuning	+
Pisang Tanduk					

Uji aktivitas antioksidan menggunakan metode penangkapan radikal DPPH (1,1-difenil-2-2pikrilhidrazil). Digunakan metode DPPH dikarenakan metode DPPH merupakan metode yang paling umum digunakan untuk menguji aktivitas antioksidan beberapa senyawa, khususnya senyawa fenolik. Selain itu metode ini cepat, harga terjangkau, teliti, bahannya mudah diperoleh dan alatnya sederhana dan semua tersedia di laboratorium. Pengukuran dilakukan dengan spektrofotometri UV-Vis dengan panjang gelombang 517 nm. Nilai  $ES_{50}$  merupakan besarnya konsentrasi senyawa uji yang mempunyai efektivitas penangkapan radikal bebas sebanyak 50%. Nilai  $ES_{50}$  standar asam galat dan ekstrak etanol daun kawa berturut-turut adalah 1,537  $\mu\text{g}/\text{mL}$  dan 57,87  $\mu\text{g}/\text{mL}$ . Aktivitas persen penangkapan radikal bebas standar asam galat dan ekstrak etanol daun kawa dapat dilihat pada Tabel III dan IV. Perbandingan nilai  $ES_{50}$  rata-rata standar asam galat dan ekstrak etanol daun kawa dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 menunjukkan nilai  $ES_{50}$  asam galat dan ekstrak etanol daun kawa berbeda signifikan. Nilai tersebut apabila dibandingkan dengan penelitian Cahyani, (2015) yang menyebutkan bahwa nilai  $IC_{50}$  ekstrak metanol daun kopi arabika tua dan robusta tua masing-masing sebesar  $8,317 \pm 0,050$   $\mu\text{g}/\text{mL}$  dan  $7,519 \pm 0,029$   $\mu\text{g}/\text{mL}$  berbeda jauh. Hal ini disebabkan selain perbedaan jenis cairan penyari juga perbedaan daun kopi yang digunakan. Daun kopi yang digunakan sebagai minuman ringan “kawa daun” sedangkan pada penelitian Cahyani adalah daun kopi segar. Aktivitas antioksidan kawa daun ini bila dibandingkan dengan aktivitas antioksidan ampas kopi kawa robusta memiliki


aktivitas antioksidan sebesar 24,61 % (Ifwarisan, 2016) memiliki aktivitas antioksidan yang lebih besar juga.

**Tabel III.** Hasil perhitungan  $ES_{50}$  standar asam galat

No.	Penangkapan radikal bebas (%)							Persamaan regresi linier	$ES_{50}$
	0,2 μg/mL	0,6 μg/mL	1 μg/mL	1,4 μg/mL	1,8 μg/mL	2,2 μg/mL	2,6 μg/mL		
1	22,78	34,62	40,52	47,60	55,15	62,11	67,62	$y = 18,22x + 21,66$	1,55
2	21,58	33,57	41,00	46,64	55,27	62,23	68,58	$y = 18,98x + 20,41$	1,50
3	23,50	33,33	40,88	49,40	55,99	62,11	68,46	$y = 18,53 x + 21,72$	1,52
4	20,62	33,45	39,80	47,36	57,07	62,23	68,94	$y = 19,62x + 19,59$	1,54
5	21,22	32,85	41,36	46,88	56,95	62,35	68,10	$y = 19,21x + 20,20$	1,55
Rerata									1,53
SD									0,02
CV									0,01%

**Tabel IV.** Hasil Perhitungan  $ES_{50}$  sampel daun kopi kawa

No.	Penangkapan radikal bebas (%)							Persamaan regresi linier	$ES_{50}$
	10 μg/mL	20 μg/mL	30 μg/mL	40 μg/mL	50 μg/mL	60 μg/mL	70 μg/mL		
1	12,7	21,93	25,09	33,69	45,57	53,69	60,97	$y = 0,81x + 3,56$	56,83
2	9,455	17,93	26,66	35,39	42,90	48,84	56,60	$y = 0,78x + 2,61$	60,44
3	10,78	19,39	28,24	36,12	44,97	51,27	61,33	$y = 0,83x + 2,82$	56,84
4	12,24	19,75	29,57	34,42	46,54	54,06	61,33	$y = 0,83x + 3,527$	55,79
5	10,42	20,00	27,03	34,66	44,24	49,45	56,84	$y = 0,76x + 3,89$	59,95
Rerata									57,97
SD									2,08
CV									3,59%



**Gambar 1.** Nilai  $ES_{50}$  rata-rata asam galat dan ekstrak etanol daun kopi kawa

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa nilai  $ES_{50}$  asam galat dan ekstrak etanol daun kawa berbeda signifikan. Nilai tersebut apabila dibandingkan dengan penelitian Cahyani, (2015) yang menyebutkan bahwa nilai  $IC_{50}$  ekstrak metanol daun kopi arabika tua dan robusta tua masing-masing sebesar  $8,317 \pm 0,050 \mu\text{g/mL}$  dan  $7,519 \pm 0,029 \mu\text{g/mL}$  berbeda jauh. Hal ini disebabkan selain perbedaan jenis cairan penyari juga perbedaan daun kopi yang digunakan. Daun kopi yang digunakan sebagai minuman ringan “kawa daun” sedangkan pada penelitian Cahyani adalah daun kopi segar. Aktivitas antioksidan kawa daun ini bila dibandingkan dengan aktivitas antioksidan ampas kopi kawa robusta memiliki aktivitas antioksidan sebesar 24,61 % (Ifwarisan, 2016) memiliki aktivitas antioksidan yang lebih besar juga.

Jika dibandingkan dengan penelitian Kusmiyati *et al.*, (2015) menyimpulkan aktivitas antioksidan seduhan daun teh hijau sebesar  $21,44 \mu\text{g/mL}$ . Penelitian Sudaryat *et al.*, (2015) menyimpulkan aktivitas antioksidan seduhan daun teh hitam sebesar  $97 \mu\text{g/mL}$ , dan penelitian Juniarka *et al.*, (2011) menyimpulkan aktivitas antioksidan bunga rosella sebesar  $19,991 \mu\text{g/mL}$ . Maka “kawa daun” masih dapat dijadikan alternatif lain sebagai minuman kesehatan yang berkhasiat sebagai antioksidan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kandungan senyawa fenolik total ekstrak etanol daun kopi kawa sebesar  $55,87 \pm 2,90 \text{ mg GAE/g ekstrak}$ . Nilai  $ES_{50}$  dalam ekstrak etanol daun kopi kawa sebesar  $57,972 \mu\text{g/mL}$ .

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1979, *Farmakope Indonesia* Edisi III, Dearemen Kesehatan RI, Jakarta  
Cahyani, Y. N., 2015, Perbandingan Kadar Fenol Total dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol Daun Kopi Robusta (*Coffea canephora*) dan Arabika (*Coffea arabica*), Skripsi, Fakultas Farmasi Universitas Jember, Jember  
Harborne, J., 1987, *Metode Fitokimia Penuntun Cara Modern Menganalisa Tumbuhan*, Cetakan 2, (K. P. Soediso, Trans.), Penerbit ITB, Bandung  
Ifwarisan, D., 2016, Pengaruh Perbedaan Lama Ekstraksi Ampas Kopi Kawa Daun (*Coffea canephora*) Menggunakan Ultrasonik Bath terhadap Komponen Bioaktif Ekstrak, Skripsi, Universitas Andalas, Padang  
Juniarka, I.G.A., Lukitaningsih, E., dan Noegrohati, S., 2011, Analisis Aktivitas Antioksidan dan Kandungan Antosianin Total Ekstrak dan Liposom Kelopak Bunga Rosella (*Hibiscus sabdathiffa L.*), *Majalah Obat Tradisional*, 16(3)115-123  
Ketaren, S., 1986, *Minyak dan Lemak Pangan*, UI-Press, Jakarta  
Kusmiyati, M., Sudaryat, Y., Lutfiah, I.A., Rustamsyah, A., dan Rohdiana, D., 2015, Aktivitas Antioksidan, Kadar Fenol Total, dan Flavonoid Total dalam Teh Hijau (*Camelia sinensis(L.) O. Kuntze*) Asal Tiga Perkebunan Jawa Barat, *Jurnal Penelitian Teh dan Kina*, 18(2): 101-106

- Murtijaya, J., dan Lim Y.Y., 2007, Antioxidant Properties of Phylanthus amarus Extracts as Affected by Different Drying Methods, *LWT-Food Sci. Technol*, 40: 1664-1669.
- Salamah, N., Widyaningsih, W., Izati,I, & Susanti, H. 2015, Aktivitas Penangkap Radikal Bebas Ekstrak Etanol Ganggang Hijau *Spirogyra sp* dan *Ulva lactuca* dengan Metode DPPH (Free Radical Scavenger Activity of Green Algae Ethanolic Extract *Spirogyra sp* and *Ulva lactuca* Using DPPH Method), *Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia*, ISSN : 1693-1831, 13(2): 145-150.
- Sashikumar, J.M., Maheshu, V., Jayadev, R., 2009, In Vitro AntioxidantActivity of Methanolic Extracts of Berbesis Tintoria Lesch.Root and Root Bark, *Herbal Medicine and Toxicology* 3(2): 53-58
- Singleton, V.L. and Rossi, J.A., 1965, Colorimetry of Total Phenolic with Phosphomolybdic-Phosphotungstic Acid Reagent, *Am. J. Enol. Vitic*, 16.
- Sudaryat, Y., Kusmiyati, M., Pelangi, C.R., Rustamsyah, A., dan Rohdiana, D., 2015, Aktvititas Antioksidan Seduhan Sepuluh Jenis Mutu Teh Hitam (*Camelia sinensis*(L.) O. Kuntze) Indonesia, *Jurnal Penelitian Teh dan Kina*, 18(2):95-100
- Susanti, H., Alfian, R., 2012, Penetapan Kadar Fenolik Total Ekstrak Metanol Kelopak Bunga Rosella Merah (*Hibiscus sabdariffa Linn*) dengan variasi tempat tumbuh secara Spektrofotometri,*Jurnal Ilmiah Kefarmasian*, 2 (1): 73-80
- Wulandari, A., 2014, Aktivitas Antioksian Kombucha Daun Kopi (*Coffea arabica*) dengan Variasi Lama Waktu Fermentasi dan Konsentrasi, Ekstrak, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta

# PENETAPAN KADAR FENOLIK TOTAL DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL DAUN KOPI KAWA DENGAN METODE DPPH

---

ORIGINALITY REPORT

---

8%

SIMILARITY INDEX

---

PRIMARY SOURCES

---

- |   |  |                |
|---|--|----------------|
| 1 | <a href="#">journal.uad.ac.id</a><br>Internet        | 194 words — 6% |
| 2 | <a href="#">jurnalnasional.ump.ac.id</a><br>Internet | 18 words — 1%  |
| 3 | <a href="#">ejournal.uksw.edu</a><br>Internet        | 17 words — 1%  |
- 

EXCLUDE QUOTES

ON

EXCLUDE MATCHES

OFF

EXCLUDE

BIBLIOGRAPHY

ON