

LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAH*

Judul karya ilmiah (artikel) : Ekstrak Heksan Biji Jintan Hitam (*Nigella sativa* L) Meningkatkan Aktivitas Fagositis Makrofag Tikus Betina Galur SD (*Sparague Dawley*) yang diinduksi DMBA (7,12 Dimetilbenz(a)antrasen) secara IN VITRO

Jumlah Penulis : 2 Orang

Nama Penulis : Akrom, Fatimah

Status Pengusul : Penulis pertama/penulis ke .../penulis korespondensi**

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Jurnal Pharma Ciana
 b. No ISSN : 2088-4559
 c. Vol, No, Bulan, Tahun : Vol 5, No. 1, tahun Mei 2015
 d. Penerbit : Universitas Ahmad Dahlan
 e. DOI artikel (jika ada) : -
 f. Alamat web jurnal : <http://journal.uad.ac.id/index.php/PHARMACIANA/>
 g. Terindeks Scimagojr/Thomson Reuter ISI Knowledge atau di...**

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah :
 (beri v pada kategori yang tepat)

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

Jurnal Ilmiah Internasional/Int. Bereputasi**
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional/ Nasional Terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS**

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen yang dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (isikan di kolom yang sesuai)					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional Terindeks DOAJ dll	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)				1		1
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)				3		3
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)				3		3
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)				3		3
Total = (100%)				10		10
Nilai Pengusul				6		6
Komentar Peer Review	<p>1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur :</p> <p align="center"><i>Jesmu</i></p> <p>2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan :</p> <p align="center"><i>Jesmu</i></p>					

3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi :

Cukup baik

4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit :

Selesai

5. Indikasi plagiasi :

Tidak ada

6. Kesesuaian bidang ilmu :

Selesai

2017

Reviewer 1/2 *

Nama Prof. Dr. Sunjaya Purnomo
NIP/NIY. 4521120477031009
Bidang Ilmu Fitokimia Fitoterapi
Jabatan Akademik Guru Besar
Unit Kerja Fakultas Farmasi UGM

*dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah

** coret yang tidak perlu

*** nasional/ terindeks di DOAJ, CABI, Copernicus

LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAH*

Judul karya ilmiah (artikel) : Ekstrak Heksan Biji Jintan Hitam (*Nigella sativa* L) Meningkatkan Aktivitas Fagositis Makrofag Tikus Betina Galur SD (*Sparague Dawley*) yang diinduksi DMBA (7,12 Dimetilbenz(a)antrasen) secara IN VITRO

Jumlah Penulis : 2 Orang

Nama Penulis : Akrom, Fatimah

Status Pengusul : Penulis pertama/penulis ke-.../penulis korespondensi**

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Jurnal Pharma Ciana
 b. No ISSN : 2088-4559
 c. Vol, No, Bulan, Tahun : Vol 5, No. 1, tahun Mei 2015
 d. Penerbit : Universitas Ahmad Dahlan
 e. DOI artikel (jika ada) : -
 f. Alamat web jurnal : <http://journal.uad.ac.id/index.php/PHARMACIANA/>
 g. Terindeks Scimagojr/Thomson Reuter ISI Knowledge atau di...**

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah :
 (beri v pada kategori yang tepat)

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

Jurnal Ilmiah Internasional/Int. Bereputasi**
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional/ Nasional Terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS**


Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen yang dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (isikan di kolom yang sesuai)					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional Terindeks DOAJ dll	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)				1		1
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)				3		2.5
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)				3		2.5
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)				3		3
Total = (100%)				10		9
Nilai Pengusul				6		5.4
Komentar Peer Review	<p>1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur : Unsur-unsur artikel lengkap dan sesuai</p> <p>2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan : Pembahasan sudah dilakukakan dengan baik dan diteliti dengan mekanisme aksi senyawa.</p>					

	<p>3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi : Parameter yg ditampilkan perlu dikonfirmasi dengan data lain sbg lbr valid</p> <p>4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit : Penerbit baik</p> <p>5. Indikasi plagiasi : tdk ada</p> <p>6. Kesesuaian bidang ilmu : sesuai dengan bidang ilmu penulis</p>
--	--

2017

Reviewer 1/2 *



Nama Dr. Nurlehasari
NIP/NIY. 60960143
Bidang Ilmu Farmasi
Jabatan Akademik LK
Unit Kerja Farmasi

*dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah

** coret yang tidak perlu

*** nasional/ terindeks di DOAJ, CABi, Copernicus

**EKSTRAK HEKSAN BIJI JINTAN HITAM
(Nigella sativa L) MENINGKATKAN
AKTIVITAS FAGOSITOSIS MAKROFAG
TIKUS BETINA GALUR SD (Sprague
Dawley) YANG DIINDUKSI DMBA
(7,12Dimetilbenz(α)antrasen) SECARA IN
VITRO**

By Akrom

7

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/299435145>

1

EKSTRAK HEKSAN BIJI JINTAN HITAM (*Nigella sativa* L) MENINGKATKAN AKTIVITAS FAGOSITOSIS MAKROFAG TIKUS...

Article · May 2015

DOI: 10.12928/pharmaciana.v5i1.2288

CITATIONS

0

READS

73

2 authors, including:



Akrom Akrom

Ahmad Dahlan University

18

29 PUBLICATIONS 7 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



Development of *Nigella sativa* oil as immunomodulator and antioxidant for metabolic syndroms patients [View project](#)



Nigella sativa as chemopreventive and immunomodulator [View project](#)

1
9 **EKSTRAK HEKSAN BIJI JINTAN HITAM (*Nigella sativa L*)
MENINGKATKAN AKTIVITAS FAGOSITOSIS MAKROFAG TIKUS
BETINA GALUR SD (*Sprague Dawley*) YANG DIINDUKSI DMBA
(7,12Dimetilbenz(α)antrasen) SECARA *IN VITRO***

**THE EFFECTS OF HEXANE EXTRACTS FROM BLACK CUMIN
SEEDS TO THE PHAGOCYTTIC ACTIVITY OF MACROPHAGES SD
(*Sprague Dawley*) STRAIN FEMALE RATS BY DMBA
(7,12Dimetilbenz(α)antrasen) INDUCED *IN VITRO***

Akrom^{1, 2}, Fatimah¹

¹Bagian Farmakologi dan Farmasi K²⁵, Fakultas Farmasi UAD

² Pusat Informasi dan Kajian Obat, Universitas Ahmad Dahlan

Jl. Prof. Dr. Soepomo, Janturan, Yogyakarta

Email: akmaa_uad@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan sebelumnya telah membuktikan bahwa minyak biji jintan hitam bersifat sebagai imunomodulator, namun bagaimana mekanisme MBJH sebagai imunomodulator pada makrofag yang diinduksi DMBA belum diketahui. Telah dilakukan penelitian untuk mengetahui efek Ekstrak Hexana Biji Jintan Hitam (EHBJH) terhadap aktifitas fagositosis makrofag peritoneal tikus SD yang diinduksi DMBA. Penelitian ini dilakukan pada 10 ekor tikus betina *Sprague Dawley* yang dibagi dalam dua kelompok, yaitu 5 tikus kelompok tanpa perlakuan DMBA dan 5 tikus kelompok perlakuan DMBA. Setelah satu minggu pemberian DMBA sebanyak 15 mg per ekor tikus, tikus dibedah dan diambil cairan peritonealnya untuk dilakukan isolasi makrofag yang akan dikultur selama 4 jam. Makrofag peritoneal tersebut diberi ekstrak heksan BJH (*Nigella sativa* Lour) sebanyak 1 μ g/mL, 5 μ g/mL, 25 μ g/mL, dan diberi standar timokuinon untuk masing-masing kelompok tanpa induksi DMBA dan kelompok perlakuan DMBA. Makrofag diinkubasi kembali selama 2 jam. Uji fagositosis dilakukan dengan menambahkan partikel lateks pada makrofag berbudaya dan pewarnaan Giemsa. Data persentase jumlah makrofa¹⁴ yang makan lateks dan indeks fagositosis dianalisis dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* yang dilanjutkan dengan uji ANOVA dan uji LSD dengan taraf kepercayaan 95%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktifitas dan indek fagositosis makrofag yang tidak diinduksi DMBA lebih besar dari pada aktifitas dan indek fagositosis makrofag yang diinduksi makrofag ($p < 0,05$). Kelompok 25 μ g/mL EHBJH memiliki aktifitas dan indek fagositosis paling tinggi jika dibandingkan dengan kelompok perlakuan yang lain ($p < 0,05$).¹ Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa ekstrak heksan BJH (*Nigella sativa* Lour) dapat meningkatkan aktivitas fagositosis makrofag tikus betina galur *Sprague Dawley*.

Kata kunci: ekstrak heksan, *Nigella sativa L*, fagositosis, makrofag

ABSTRACT

Previous research has shown that black cumin seed oil is as an immunomodulator, but the mechanism MBJH as an immunomodulator in DMBA-induced macrophage unknown. A study to determine the effects of EHBJH on the activities of SD rat peritoneal macrophage phagocytosis induced DMBA has been conducted. This study was conducted on 10 female *Sprague Dawley* rats were divided into two groups, namely 5 mice without any treatment group and 5 mice DMBA DMBA treatment groups. Once a week administration of 15 mg DMBA of mice, rats dissected and taken peritoneal fluid for isolation of macrophages to be cultured for 24 hours. The peritoneal

macrophages were given hexane BJH (*Nigella sativa* Lour) as much as 1 mg/mL, 5 mg/mL, 25 mg/mL, and were given a standard timokuinon for each group without induction DMBA and DMBA treatment groups. Macrophages were incubated for 2 hours back. Phagocytosis test is done by adding the latex particles on cultured macrophages and Giemsa staining. Data percentage of macrophages that eat latex and phagocytosis index were analyzed using the Kolmogorov-Smirnov test followed by ANOVA and LSD test with a 95% confidence level. The results showed that the activity and phagocytosis index DMBA -induced macrophages that is not greater than the index of activity and macrophage phagocytosis induced macrophages ($p < 0.05$). A group of 25 mg/mL EHBHJH have activity and phagocytosis index is highest when compared with the other treatment group ($p < 0.05$). Conclusion: The study showed that the hexane BJH (*Nigella sativa* Lour) can improve macrophage phagocytic activity of female rats *Sprague Dawley* strain.

Keywords: hexane extract, *Nigella sativa*, macrophage, phagocytosis.

PENDAHULUAN

Sistem imun adalah semua mekanisme yang digunakan tubuh untuk mempertahankan ketahanan terhadap bahaya yang ditimbulkan berbagai bahan dalam lingkungan hidup (Harjanto, 2000). Senyawa yang bersifat immunosupresif seperti 7,12-dimetilbenz(a) antrase (DMBA) dapat melemahkan sistem imun. Senyawa 7,12-dimetilbenz(a) antrasen (DMBA) adalah zat kimia yang banyak terdapat di dalam asap dapur, kendaraan bermotor dan asap rokok, termasuk dalam polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH), dikenal bersifat mutagenik, teratogenik, karsinogenik, sitotoksik, dan immunosupresif. Kontaminasi DMBA biasa terjadi melalui makanan atau peroral, inhalasi maupun kontak kulit (Sitarina, 2010). Enzim sitokrom P450 1A1 atau 1B1 (CYP1A1 atau CYP1B1) dan enzim microsomal hidrolase pada metabolisme fase I merubah DMBA menjadi DMBA-3,4-diol-1,2-epoksida (DMBA-DE) yang bersifat elektrofilik dan bersifat genotoksik dan immunosupresif. Eliminasi DMBA-DE dari tubuh dipercepat dengan adanya enzim antioksidan glutation-Stransferase (GST) (Gao *et al.*, 2007). Penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa penghilangan sitokrom P450 1B1 (CYP1B1) dan mikrosoma epoksida hidrolase (MEH) oleh Gao *et al.*, (2007 & 2008) melindungi tikus terhadap immunosupresi sel limpa yang diproduksi oleh DMBA secara *in vivo*. Meningkatnya kejadian penyakit autoimun serta degenerative di masyarakat akhir-akhir ini diduga berkaitan dengan tingginya cemaran udara yang mengandung agen immunosupresansia seperti DMBA. Diperlukan agen immunostimulansia untuk mengimbangi agen immunosupresan yang masuk dalam tubuh.

Sistem imun dapat ditingkatkan dengan agen immunostimulansia. Pemanfaatan tanaman telah dilakukan manusia sejak berabad-abad yang lalu sebagai pengobatan (Tejasari, 2000). Salah satu jenis tanaman yang dimanfaatkan dalam pengobatan adalah jintan hitam. Salah satu khasiat dari biji jintan hitam (BJH) adalah sebagai immunomodulator, BJH dengan zat aktif utamanya timokuinon dapat meningkatkan kekebalan tubuh (Akrom, 2013; Salem, 2005). Pemberian secara oral minyak BJH pada hamster yang diinduksi streptozotocin (STZ) terbukti meningkatkan aktivitas fagositosis makrofag peritoneum dan jumlah limfosit di dalam darah perifer dibandingkan hamster dengan diabetes yang tidak diberi MBHJH (Salem, 2005). Meskipun aktifitas immunomodulator BJH sudah banyak diteliti namun bagaimana pengaruh BJH *in vitro* terhadap efek immunosupresif DMBA belum diteliti.

Makrofag sebagai efektor sistem imun berperan memusnahkan kuman atau patogen yang akan merusak tubuh (Harjanto, 2000; Wijayanti, 2000). Melalui toll like receptor (TLR) makrofag dapat secara langsung kontak dengan pathogen termasuk immunogen dari tanaman sehingga menjadi aktif (Inley, 2010). Peningkatan aktifitas makrofag, ditandai dengan perubahan bentuk, perubahan biokimiawi, serta perubahan fungsi dari makrofag, merupakan salah satu parameter untuk menilai peningkatan sistem imun (Ulya, 2012; Baratawidjaja, 2006). Ekstrak heksan BJH yang banyak mengandung timokuinon dan asam lemak tak jenuh diduga dapat meningkatkan aktifitas fagositosis makrofag secara *in vitro* baik pada makrofag tikus yang tidak diinduksi maupun diinduksi DMBA.

METODE PENELITIAN

Bahan Penelitian

B²⁷intan hitam, ekstrak heksan BJH, heksan, PBS (*phosphate buffered saline*), FBS (*fetal bovine serum*), Giemsa, lateks, penstrep, fungison/*amphotericine*, metanol, *aquadest*, RPMI, dan alkohol.

Jalannya Penelitian

1. Pembuatan ekstrak heksan biji jinten hitam (EHB²⁸JH)

Serbuk BJH seberat 500 gram dimaserasi dengan pelarut heksan sebanyak 1 liter selama 24 jam. Maserasi dilakukan bertingkat dengan masing-masing pelarut yang lebih sedikit dari pelarut pertama yaitu 750 mL. Setelah didiamkan selama 1 malam kemudian diaduk dengan alat pengaduk elektrik selama setengah jam kemudian didiamkan lagi selama 1 malam, kemudian disaring dengan corong *bucner* dan filtratnya dipisah (maserat 1). Ampas dari hasil penyaringan maserat 1 kemudian ditambahkan lagi dengan heksan sampai serbuknya terendam semua, kemudian diaduk dengan alat pengaduk dan kemudian disaring ampasnya (maserat 2). Prosedur yang sama diulangi lagi hingga mendapatkan maserat 3. Ketiga maserat hasil penyarian kemudian dicampur, campuran maserat kemudian diuapkan pada *rotary evaporator* pada suhu 50°C sampai heksan tidak ada lagi yang menguap dan mendapatkan ekstrak kental. Ekstrak diuapkan dalam cawan petri dengan menggunakan *waterbath*. Ekstrak yang diperoleh disimpan dalam botol.

2. Uji efek EHB²⁹JH terhadap aktifitas fagositosis makrofag

Prosedur pelaksanaan uji efek EHB³⁰JH terhadap aktifitas fagositosis makrofag sesuai dengan prosedur yang dilakukan pada penelitian sebelumnya.

(i). Persiapan hewan uji.

B³¹us betina galur SD berumur 1-2 bulan dipilih secara acak dibagi menjadi 2 kelompok masing-masing 5 ekor. Kelompok I, kelompok tanpa pemberian perlakuan dengan DMBA dan kelompok II diberi DMBA 15 mg per ekor tikus secara intragastrik. Setelah pemberian DMBA

selama 1 minggu kemudian tikus dibedah untuk diambil makrofag peritonealnya.

(ii). Pembuatan larutan uji EHB³²JH.

Larutan uji dibuat dengan melarutkan ekstrak heksan seberat 25 mg dalam *tween 80* sebanyak 5 mikroliter, dan tambahkan dengan medium komplit (MK) 995 mikroliter dimasukkan dalam Eppendorf steril. Proses tersebut dilakukan di *laminar air flow cabinet*. Sehingga diperoleh larutan induk dengan konsentrasi 25 mg/mL.

Kemudian dari larutan induk ini buat konsentrasi kadar dengan kadar 25 µg/mL, 5 µg/mL dan 1 µg/mL. Konsentrasi 25 µg/mL diambil 6,25 µg, untuk konsentrasi 5 µg/mL diambil 1,25 µg, dan untuk kadar 1 µg/mL diambil 0,25 µg dari larutan induk yang kemudian masing-masing ditambahkan larutan MK sampai 5 mL.

(iii). Pembuatan PBS sebagai larutan pencuci.

Larutan PBS terdiri dari NaCl 8 gram, KH₂PO₄ 0,1 gram dan NaHPO₄ 2,9 gram dilarutkan ke dalam *aquadest* 1 liter diaduk sampai semua serbuk terlarut, dibuat pH 7,2 jika terlalu asam ditambah larutan NaOH 1 N dan jika terlalu basa ditambahkan *aquades* sampai 1L. Larutan disimpan dalam almari es di dalam botol tertutup (Anonim, 1998).

(iv). Isolasi dan kultur makrofag.

Isolasi makrofag dilakukan dengan menggunakan metode yang digunakan oleh Akrom (2013). Kesepuluh tikus di bunuh dengan ⁶ glukose menggunakan kloroform. Tikus diletakkan dalam posisi terlentang, kulit bagian perut dibuka dan dibersihkan selubung peritoniumnya dengan alkohol 70%, kemudian disuntikkan 10 ml medium RPMI dingin kedalam rongga peritoneum, ditunggu selama tiga menit sambil digoyang-goyang perutnya secara perlahan. ¹³ lanjutnya cairan peritoneum dikeluarkan dari rongga peritoneum dengan cara menekan rongga dalam dengan dua jari, cairan diaspirasi. Dengan spuit injeksi, dipilih pada bagian yang tidak berlemak dan jauh dari usus. Cairan peritonium dari masing-masing tikus tersebut dimasukkan dalam dua *plate*/tabung yang berbeda yaitu satu *plate*/tabung kelompok diinduksi DMBA dan satu *plate*/tabung untuk kelompok tak diinduksi DMBA.

(a). Penghitungan sel viabel. Sel makrofag yang sudah diisolasi dan viable yang akan dilakukan kultur perlu ditetapkan jumlahnya. Prosedur perhitungan sel makrofag secara ringkas adalah

sebagai berikut: dek gelas dibersihkan dengan tisu beralkohol, kemudian dipasangkan pada alat sesuai dengan ukuran tempat, cairan makrofag diaduk, cairan dimasukkan dalam tabung steril, diambil dengan pipet ke alat *haematocytometer* dan ditentukan viabilitasnya dengan larutan *trypan blue* kemudian dibaca menggunakan alat *microscope inverted* dengan perbesaran 100 kali. (b). Kultur makrofag dan uji aktifitas fagositosis makrofag. Suspensi sel ditumbuhkan dalam *mikrokultur* 24 sumuran yang telah diberi *coverslips* bulat. Setiap sumuran diisi 1 mL yang mengandung 5×10^5 sel. Sel diinkubasikan dalam inkubator CO₂ 5% selama 24 jam (Akrom, 2013). Setelah diinkubasi selama 24 jam, media dibersihkan dan ditambahkan 1 mL sampel uji yaitu 25 µg/mL, 5 µg/mL dan 1 µg/mL EHBJH sesuai dengan kelompok. Kelompok 1 untuk diberi EHBJH konsentrasi 1 µg/mL, kelompok 2 diberi EHBJH konsentrasi 5 µg/mL, kelompok 3 diberi EHBJH konsentrasi 25 µg/mL, kelompok 4 sebagai kontrol positif diberi timokuinon standar, dan kelompok 5 sebagai kontrol medium diberi RPMI.

Uji fagositosis dilakukan secara *in vitro*, dilakukan sesuai prosedur yang digunakan pada penelitian sebelumnya (Akrom, 2013). Sel yang sudah diberi sampel dan diinkubasi dalam CO₂ 5% 37°C selama 1 jam. Kemudian supernatan dibuang dan dicuci 2 kali dengan RPMI. Pencucian diulangi kembali dengan menggunakan PBS 3x sebanyak 500 mikroliter/sumuran. Setelah bersih kemudian sel makrofag selanjutnya diinkubasi selama 1 jam.

Fiksasi dilakukan dengan menambahkan pada masing-masing *micro plate* (sumuran) dengan 100 mikroliter metanol absolut. Fiksasi dilakukan selama 30 detik. Setelah difiksasi kemudian kultur makrofag dikeringkan dengan kipas angin kembali dan ditambahkan 200 µL Giemsa 20% pada sumuran yang telah dikeringkan. Setelah itu, didiamkan pada suhu 26°C ± 20 menit kemudian sisa Giemsa dibuang dan dicuci dengan air mengalir tetapi tidak sampai bersih dan kemudian dikeringkan dengan kipas angin. *Coverslip* pada masing-masing sumuran diambil dan diletakkan di atas objek glass dan diamati. Selanjutnya diamati dengan mikroskop dan akan terlihat lateks yang berwarna putih dan makrofag berwarna ungu. Presentase sel makrofag yang memfagositosis partikel lateks

yang difagositosis dihitung minimal 100 sel diperiksa dengan mikroskop cahaya perbesaran 400x (Akrom, 2013).

3. Analisis data

Analisis data menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* yang dilanjutkan dengan uji ANOVA dan uji LSD dengan taraf kepercayaan 95%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembuatan ekstrak heksan biji jinten hitam

Hasil penyarian dengan metode maserasi dengan pelarut heksan diperoleh EHBJH dengan rendemen sebesar 26,44%. Dari bahan awal seberat 500 gram dan diperoleh bobot ekstrak 132,18 gram. Secara makroskopis EHBJH berwarna hijau gelap, berminyak dan berbau khas minyak atsiri.

2. Uji efek EHBJH terhadap aktivitas fagositosis makrofag

Uji daya aktivitas fagositosis dilakukan menggunakan metode *in vitro*. Keunggulan metode *in vitro* yaitu waktu yang digunakan lebih singkat, biaya lebih murah serta penggunaan sampel yang digunakan lebih sedikit apabila dibandingkan *in vivo*. Selain itu proses fagositosis yang terjadi dapat di amati secara langsung (Miksusanti, 2010). Kelemahan *in vitro* adalah media yang digunakan kondisinya tidak mesti sama dengan yang digunakan dalam metode *in vivo* (Nurcholis, 2011).

Kemampuan fagositosis makrofag diukur dengan melihat seberapa besar kemampuan makrofag memakan lateks, yaitu dengan menghitung persentase jumlah makrofag yang makan lateks pada setiap kelompok perlakuan serta menghitung indeks fagositosisnya. Aktifitas fagositosis makrofag ditunjukkan pada Gambar 1:

Partikel lateks yang terpejan dengan fagosit akan ditangkap dan ditelan dengan bantuan reseptor pada membran sel pada gambar di atas. Hasil perhitungan persentase


jumlah makrofag yang makan lateks pada setiap kelompok dapat dilihat pada Tabel I.

Dari hasil perhitungan pada Tabel I diketahui bahwa persentase fagositosis makrofag tikus tak diinduksi DMBA lebih tinggi jika dibandingkan dengan tikus yang diinduksi DMBA ($p < 0,05$). Makrofag yang diinduksi DMBA mengalami penurunan aktifitas fagositosis, hal ini dapat disebabkan karena hasil metabolit DMBA yang berupa DMBA-DE dapat berikatan dengan DNA dan menyebabkan kerusakan DNA dengan membentuk *adduct* dengan basaguanin dalam DNA sehingga menimbulkan kerusakan sel dan dapat menurunkan aktivitas fagositosis makrofag peritoneal (Gao *et al*, 2008; 2007).

Urutan kemampuan fagositosis berdasarkan persentase jumlah makrofag yang makan lateks dari yang terkecil sampai terbesar pada tikus tanpa induksi DMBA adalah: kontrol negatif, konsentrasi 1 $\mu\text{g/mL}$, 5 $\mu\text{g/mL}$, 25 $\mu\text{g/mL}$ dan yang terakhir adalah kontrol positif (timokuinon). Kemudian untuk urutan kemampuan fagositosis berdasarkan persentase jumlah makrofag yang makan lateks dari yang terkecil sampai yang terbesar pada tikus yang diinduksi DMBA adalah: kontrol negatif, konsentrasi 1 $\mu\text{g/mL}$, 5 $\mu\text{g/mL}$, 25 $\mu\text{g/mL}$ dan yang terakhir adalah kontrol positif (timokuinon).

Hasil perhitungan indeks fagositosis makrofag peritoneal tikus SD yang diinduksi DMBA atau tak diinduksi DMBA dengan pemberian EHBHJH disajikan pada Tabel II.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks fagositosis makrofag tikus SD yang tak diinduksi DMBA lebih tinggi dari pada indeks fagositosis makrofag tikus SD yang diinduksi DMBA ($p < 0,05$). Kelompok 25 $\mu\text{g/mL}$ EHBHJH memiliki indeks fagositosis tertinggi dibandingkan dengan kelompok yang lain. Sedangkan urutan kemampuan fagositosis berdasarkan indeks fagositosisnya dari yang terkecil sampai terbesar pada tikus tanpa induksi DMBA adalah: kontrol negatif, konsentrasi 1 $\mu\text{g/mL}$, 5 $\mu\text{g/mL}$, 25 $\mu\text{g/mL}$ dan yang terakhir adalah kontrol positif (timokuinon). Kemudian untuk urutan kemampuan fagositosis berdasarkan nilai indeks fagositosis dari yang terkecil sampai yang terbesar pada tikus yang diinduksi DMBA adalah: konsentrasi 1 $\mu\text{g/mL}$, kontrol negatif, 5 $\mu\text{g/mL}$, 25 $\mu\text{g/mL}$ dan yang terakhir adalah kontrol positif (timokuinon). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan makrofag dalam memfagositosis lateks semakin meningkat dengan penambahan timokuinon serta semakin besar kadar timokuinon maka semakin besar pula kemampuan fagositosis dari makrofag.



Gambar 1. Aktifitas fagositosis makrofag peritoneal tikus SD yang diinduksi DMBA atau tak diinduksi DMBA dengan pemberian EHBHJH secara *in vitro*. Makrofag dicat dengan Giemsa dibaca pada perbesaran 10x10. A=makrofag yang memfagositosis latek; B=makrofag yang tidak memfagositosis latek

Tabel I. Persentase fagositosis makrofag peritoneal tikus SD diinduksi DMBA dan tak diinduksi DMBA setelah diberi EHBHJH

Kelompok Perlakuan	Persentase fagositosis makrofag peritoneal tikus SD		Selisi persentase fagositosis makrofag yang diinduksi & tak diinduksi DMBA
	Tak diinduksi DMBA	Diinduksi DMBA	
1 µg/mL	54,93 ± 3,52 ^{*a}	51,37 ± 4,35 ^{*a}	3,56±0,20
5 µg/mL	57,34 ± 0,88 ^{*a}	52,71 ± 2,49 ^{*a}	4,63±0,34
25 µg/mL	56,46 ± 3,83 ^{*a}	55,38 ± 1,32 ^{*a}	1,08±0,32
Timokuinon	63,33 ± 3,83 [*]	59,93 ± 2,82 [*]	3,40±0,21
Medium	47,94 ± 0,03 ^a	45,56 ± 1,88 ^a	2,38±0,24

Ket: * = p<0,05 uji beda rata-rata terhadap kelompok medium; a=p<0,05 uji beda rata-rata terhadap timokuinon

Tabel II. Indeks fagositosis makrofag peritoneal tikus SD yang diinduksi dan tak diinduksi DMBA dengan pemberian EHBHJH

Kelompok Perlakuan	Indeks fagositosis makrofag peritoneal tikus SD		Selisi indeks fagositosis
	Tak diinduksi DMBA	Diinduksi DMBA	
1 µg/mL	2,44 ± 0,18 ^{*a}	1,71 ± 0,136	0,73±0,12 [*]
5 µg/mL	2,54 ± 0,01 ^{*a}	2,08 ± 0,05 [*]	0,46±0,10 [*]
25 µg/mL	2,91 ± 0,26 [*]	2,21 ± 0,096 [*]	0,70±0,13 [*]
Timokuinon	2,71 ± 0,44 [*]	2,11 ± 0,015 [*]	0,60±0,23 [*]
Medium	1,70 ± 0,04	1,86 ± 0,075	0,16±0,21

Ket: * = p<0,05 uji beda rata-rata terhadap kelompok medium; a=p<0,05 uji beda rata-rata terhadap timokuinon

Tujuan dari pemberian induksi DMBA adalah untuk membandingkan kemampuan fagositosis tikus tanpa induksi DMBA dan tikus yang diinduksi DMBA serta untuk mengetahui kemampuan EHBHJH dalam meningkatkan kemampuan fagositosis makrofag hingga memiliki kemampuan yang setara dengan kondisi tanpa induksi DMBA. Kelompok perlakuan diberikan DMBA sebesar 15 mg per ekor tikus. Tikus tanpa induksi DMBA maupun tikus yang diinduksi DMBA dibedah satu minggu setelah pemberian DMBA, untuk diambil makrofag peritonealnya yang kemudian dikultur selama 24 jam. Setelah 24 jam makrofag peritoneal tersebut diberi EHBHJH (*Nigella sativa* Lour) dan standar timokuinon sesuai dengan kelompoknya yaitu kelompok konsentrasi 1 µg/mL, 5 µg/mL, 25 µg/mL, kontrol positif yang diberi standar timokuinon, dan kontrol negatif yang tidak diberi EHBHJH maupun standar timokuinon (Akrom, 2013).

Penambahan timokuinon dapat meningkatkan aktivitas fagositosis karena timokuinon menginduksi enzim *neu4 sialidase* yang berperan dalam mekanisme aktivasi

makrofag. Neu4sialidase berperan dalam hantaran respon dari TLR4 menuju makrofag yaitu meningkatkan kompleks antara TLR4 dan myd88 (Finlay *et al*, 2010). TLR4 merupakan reseptor ada dipermukaan makrofag, sinyal dari TLR mengaktifkan respon imun non spesifik, cirinya yaitu merangsang produksi faktor transkripsi yang menghasilkan produksi berbagai protein dan makrofag melepas sejumlah sitokin yang berperan dalam respon imun (Baratawidjaja, 2006).

Seperti yang sudah dikemukakan bahwa biji *Nigella sativa* memiliki komposisi kimia terdiri dari 32-40% minyak, 0,4-0,45% minyak atsiri yang berupa timokuinon (Akrom, 2013). Timokuinon larut dalam kloroform, PE, dan heksan. Berdasarkan penelitian Ashraf *et al* (2011) ekstrak heksan BJH terbukti mengandung timokuinon sebanyak 248 mg/g ekstrak. Kandungan senyawa dari BJH yaitu timokuinon memiliki efek menginduksi enzim Neu4 sialidase yang berperan dalam aktivasi transduksi sinyal reseptor TLR4 makrofag (Finlay, 2010). Neu4 sialidase berperan meningkatkan myd88 yang berikatan kompleks dengan TLR4 yang

nantinya akan menginduksi faktor transkripsi dan mengaktivasi makrofag (Akira, 2003).

KESIMPULAN

Pemberian EHBH (*Nigella Sativa* Lour) dapat meningkatkan aktifitas fagositosis makrofag tikus betina galur SD yang diinduksi DMBA secara *invitro*.

21

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada Ford Foundation, melalui program Indonesian Scholar Dissertation Award (ISDA), telah bersedia membiayai penelitian disertasi yang penulis ajukan.

DAFTAR PUSTAKA

20

Akira, Shizuo., 2003, Toll-like Receptor Signaling, *The Journal Of Biological Chemistry*, Vol. 278: 38105–38108.

Akrom., 2013. Ekanisme kemopreventive MBJH pada tikus Sprague dawley (SD) yang diinduksi 7,12 dimethylbenza(a) anthracene (DMBA), *Disertasi*, Pasca Sarjana, UGM, Yogyakarta.

10

Ashraf, S.S., Rao, M.V., Kaneez, F.S., Qadri, S., Al-Marzouqi, A.H., Chandranath, I.S., Adem, A., 2011, *Nigella sativa* Extract as a Potent Antioxidant for Petrochemical-Induced Oxidative Stress, *Journal of Chromatographic Science*, Vol. 49.

11

Badr, G., Mohany, M., Abu-Tarboush, F., 2011, Thymoquinone decreases F-actin polymerization and the proliferation of human multiple myeloma cells by suppressing STAT3 phosphorylation and Bcl2/Bcl-XL expression, *Lipids in Health and Disease*, 10:236.

5

Baratawidjaja., K. G., 2006, *Imunologi Dasar* edisi keempat, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran UI, Jakarta.

8

Finlay, T. M., Abdulkhalek, S., Gilmour, 8., Guzzo, C., Jayanth, P., Amith, S. R., Szewczuk, M. R., 2010, Thymoquinone-

induced Neu4 sialidase activates NFkappaB in macrophage cells and pro-inflammatory cytokines in vivo. *Glycoconj J*, 27(6), 583-600. doi: 10.1007/s10719-010-9302-5.

3

Gao, J., Lauer, F.T., Mitchell, L.A., Burchiel, S.W., 2007, Microsomal epoxide hydrolase is required for 7,12-dimethylbenz[a]anthracene (DMBA) induced immunotoxicity in mice. *Toxicol Sci*, 98:137–144.

Gao, J., Mitchell, L.A., Lauer, F.T., Burchiel, S.W., 2008, p53 and ATM/ATR Regulate 7,12-Dimethylbenz(a)anthracene Induced Immunosuppression, *Molecular Pharmacology*, 73:137.

5

Hariyanto, P. N. (ed.), 2000, *Malaria epidemiologi, Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Penanganannya*, ECG, Jakarta.

23

Miksusanti, 2010, Proliferasi Sel Limfosit Secara In Vitro oleh Minyak Atsiri Temu Kuncidan Film Edibel Anti Bakteri, *Jurnal Penelitian Sains*, 10:06-07.

Nurcholis, Mochamad, dan Zubaidah., E., 2011, Evaluasi In Vivo Efek Sinbiotik Bekatul Terfermentasi Bakteri Asam Laktat Probiotik (*Lactobacillus plantarum* B2 dan *Lactobacillus casei*), *Jurnal Teknologi Pertanian*, 58-67.

17

Salem, M. L., 2005, Immunomodulatory and Therapeutic Properties of The *Nigella sativa* L. seed, *International Immunopharmacology*, 5:1749-1770.

19

Tejasari., 2000, Efek Proteksi Komponen Bioaktif Oleoresin Rimpang Jahe (*Zingiber officinale* Roscoe) Terhadap Fungsi Limfosit Secara In Vitro, *Disertasi*. Program Pascasarjana, IPB, Bogor.

Ulya, A.N., 2012, Efek Peningkatan Aktivitas Fagositosis Makrofag Fraksi Kloroform Ekstrak Etanol Kelopak Rosella (*Hibiscus ssabdarifa* L) secara in

vitro, Skripsi, Fakultas Farmasi, UAD, Yogyakarta.

15
Sitarina., W., dan Budi, R.T., 2010, Dampak Induksi Karsinogenesis Glandula Mammariae dengan 7, 12-dimetilbenz(a)antrasen terhadap Gambaran Histopatologis lambung Tikus *Sprague Dawley*, *Jurnal Veteriner* ISSN: 1411-8327.

1
Wijaya, A., 2007, Pengaruh Pemberian Ekstrak Etanol Biji Jinten Hitam (*Nigella sativa*, Lour) Terhadap Aktivitas Fagositosis Makrofag Mencit Jantan Galur *Swiss* Setelah Infeksi *Listeria monocytogenes* Secara *In Vitro*, Skripsi, Fakultas Farmasi, UAD, Yogyakarta

5
Wijayanti, M.A., 2000, Sekresi reactive oxgen intermediates oleh makrofag peritoneum mencit yang diimunisasi selama infeksi *Plasmodium berghei*, *BIK*, 32,2:77-82.

EKSTRAK HEKSAN BIJI JINTAN HITAM (*Nigella sativa* L) MENINGKATKAN AKTIVITAS FAGOSITOSIS MAKROFAG TIKUS BETINA GALUR SD (Sprague Dawley) YANG DIINDUKSI DMBA (7,12Dimetilbenz(α)antrasen) SECARA IN VITRO

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	scholar.uad.ac.id Internet	83 words — 2%
2	pascasarjana.uad.ac.id Internet	54 words — 1%
3	Gary Carlson. "Metabolism and Toxicity of Styrene in Microsomal Epoxide Hydrolase-Deficient Mice", <i>Journal of Toxicology and Environmental Health Part A</i> , 01/2010 Crossref	51 words — 1%
4	www.intechopen.com Internet	44 words — 1%
5	eprints.uad.ac.id Internet	37 words — 1%
6	dokumen.tips Internet	37 words — 1%
7	curis.ku.dk Internet	37 words — 1%
8	internationalscienceindex.org Internet	35 words — 1%
9	journal.bio.unsoed.ac.id Internet	

		35 words — 1%
10	www.eng.uaeu.ac.ae Internet	32 words — 1%
11	www.jbc.org Internet	29 words — 1%
12	pio.uad.ac.id Internet	28 words — 1%
13	eprints.undip.ac.id Internet	23 words — 1%
14	eprints.ums.ac.id Internet	23 words — 1%
15	digilib.unila.ac.id Internet	21 words — 1%
16	muhammadyaniishak.blogspot.co.id Internet	20 words — 1%
17	m.scirp.org Internet	19 words — 1%
18	halshs.archives-ouvertes.fr Internet	19 words — 1%
19	www.jvetunud.com Internet	18 words — < 1%
20	ramsites.net Internet	12 words — < 1%
21	www.journal.unipdu.ac.id Internet	12 words — < 1%
22	repository.usu.ac.id Internet	11 words — < 1%

23	ebookinga.com Internet	10 words — < 1%
24	repository.ugm.ac.id Internet	9 words — < 1%
25	bandung.linux.or.id Internet	9 words — < 1%
26	etd.eprints.ums.ac.id Internet	8 words — < 1%
27	www.jlr.org Internet	8 words — < 1%
28	Tabasi, Nafise, Mahmoud Mahmoudi, Maryam Rastin, Hamid Reza Sadeghnia, Mojtaba HosseinPour Mashhadi, Shahrzad Zamani Taghizade Rabe, and Abolfazl Khajavi Rad. "Cytotoxic and apoptogenic properties of Nigella sativa and thymoquinone, its constituent, in human renal cell carcinoma are comparable with cisplatin", Food and Agricultural Immunology, 2015. Crossref	6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE MATCHES OFF