

HASIL CEK-2 Quagga Bakteri lalat

by Oktira Roka Aji

Submission date: 31-Aug-2021 01:27PM (UTC+0700)

Submission ID: 1638719337

File name: 2 Quagga Bakteri lalat.pdf (250.22K)

Word count: 2929

Character count: 18149

Analisis Resistensi Antibiotik Pada Bakteri Yang Berasosiasi Dengan Lalat (*Musca domestica*)

11

Oktira Roka Aji¹⁾

¹⁾Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Terapan, Universitas Ahmad Dahlan
Email: oktira.aji@bio.ud.ac.id

APA Citation: Aji, O. R. (2020). Analisis Resistensi Antibiotik Pada Bakteri Yang Berasosiasi Dengan Lalat (*Musca domestica*). Quagga: Jurnal Pendidikan dan Biologi, 12(1), 11-16. doi: 10.25134/quagga.v12i1.2026.

20

Received: 28-09-2019

Accepted: 30-12-2019

Published: 20-01-2020

Abstrak: Banyak penyakit yang penyebarannya diperantarai oleh lalat (*Musca domestica*). Lalat merupakan salah satu vektor mekanis dalam penyebaran penyakit. Saat ini, bakteri resisten antibiotik menjadi masalah serius bagi kesehatan global. Penyebaran bakteri ini salah satunya dapat diperantarai oleh lalat. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya kualitas hidup masyarakat sekitar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keberadaan bakteri resisten antibiotik yang berasosiasi dengan lalat dewasa (*M. domestica*) yang dikumpulkan dari tempat pembuangan sampah di sekitar kampus Universitas Ahmad Dahlan, Banguntapan, Yogyakarta. Tahapan penelitian yang dilakukan yaitu isolasi bakteri yang berasosiasi dengan lalat dewasa kemudian menguji kepekaan bakteri tersebut terhadap antibiotik kanamycin, chloramphenicol, amoxycillin, tetracycline, ciprofloxacin, gentamicin, dan erythromycin. Dari 12 lalat yang ditangkap, bakteri yang diperoleh sebanyak 20 isolat. Persentase resistensi masing-masing isolat terhadap antibiotik yang diujikan berdasarkan pengukuran zona hambat yang diperoleh yaitu kanamycin 0%, chloramphenicol 25%, amoxycillin 25%, tetracycline 50%, ciprofloxacin 0%, gentamicin 0%, dan erythromycin 75%. Hasil analisis antibiotik menunjukkan bahwa semua isolat bakteri yang diperoleh telah resisten terhadap satu ataupun dua antibiotik yang diujikan.

Kata Kunci: *Musca domestica*; Resistensi antibiotik; Bakteri.

Abstract: The housefly, *Musca domestica* insect in close contact with human. It is a vector for various pathogenic bacteria in human. Housefly can carry human pathogens from garbage/dump area, hospital, public parks, animal farms, and domestic habitation. This study examines the antibiotics resistance of bacteria isolated from *Musca domestica* collected from several garbage dump in Universitas Ahmad Dahlan campus, Banguntapan, Yogyakarta. Isolation of bacteria from external surface of the flies was performed using MacConkey Agar (MA). Antimicrobial susceptibility testing was performed using CLSI guideline. There were 7 antibiotics have been used : kanamycin, chloramphenicol, amoxycillin, tetracycline, ciprofloxacin, gentamicin, and erythromycin. A total of 10 houseflies were sampled from different location. Antimicrobial testing showed that all the isolates were resistant to one or two antimicrobial agents that have been used in this study. The present study support the belief that the housefly is important in the spreading of bacterial pathogens and antibiotics resistance.

Keywords: *Musca domestica*; Antibiotics resistance; Bacteria.

PENDAHULUAN

Lalat (*Musca domestica*) ditetapkan sebagai vektor mekanis yang paling penting secara medis dalam penyebaran penyakit (WHO, 2006; Scott *et al.*, 2014; Sarwar, 2015). Beberapa bakteri patogen yang berasosiasi dengan lalat telah berhasil diisolasi dari berbagai jenis area, seperti area peternakan, rumah sakit, pasar, tumpukan sampah, restoran

dan kantin sekolah. Bakteri patogen banyak yang ditemukan pada permukaan tubuh lalat dewasa maupun pada larva lalat. Beberapa bakteri patogen yang ditemukan berasosiasi dengan lalat yaitu *Actinobacter*, *Aeromonas*, *Clostridium*, *Cronobacter*, *Diphthroid*, *Enterobacter*, *Escherichia*, *Helicobacterium*, *Klebsiella*, *Methylobacterium*, *Morganella*, *Micrococcus*, *Proteus*, *Providencia*,

*Pseudomonas, Salmonella, Serratia, Shigella*¹⁰, *Staphylococcus*, dan *Streptococcus* (Grubel *et al.*, 1997; Banjo *et al.*, 2005; Lamiaa *et al.*, 2007; Vazirianzadeh *et al.*, 2008; Buttler *et al.*, 2010; Fasanella *et al.*, 2010; Gupta *et al.*, 2011; Kassiri *et al.*, 2012).

Saat ini, kesadaran tentang penggunaan antibiotik dengan benar banyak digalakkan. Hal ini dikarenakan banyaknya kemunculan bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Resistensi antibiotik adalah keadaan dimana mikroba penyebab penyakit tidak bisa lagi dibunuh dengan menggunakan antibiotik tersebut. Saat ini, informasi resistensi antibiotik di Indonesia masih sangat terbatas. Pada tahun 2015, WHO telah menetapkan *Global Awareness on Antimicrobial Resistance* (AMR) untuk menanggulangi kasus resistensi antibiotik yang terus meningkat di dunia. Indonesia juga telah menetapkan agenda nasional demi mendukung program WHO tersebut mulai tahun 2017 (Parathon *et al.*, 2017). Penyebaran bakteri resisten antibiotik menjadi masalah serius bagi kesehatan global. Penyebaran bakteri ini salah satunya dapat diperantara oleh lalat sebagai faktor mekanis penyebaran bakteri patogen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keberadaan bakteri resisten antibiotik yang berasosiasi pada lalat dewasa (*M. domestica*) yang dikumpulkan dari tempat pembuangan sampah di sekitar kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan berlokasi dekat dengan rumah sakit, pasar tradisional, dan pemukiman warga sehingga kemungkinan berpengaruh pada profil bakteri pada lalat yang ada di sekitar kampus.

METODOLOGI PENELITIAN

Pengambilan Sampel

Lalat ditangkap secara manual menggunakan jaring pada empat lokasi tempat sampah di sekitar kampus Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.

Isolasi Bakteri

Lalat yang berhasil ditangkap lalu dimasukkan ke dalam 1 mL 0.85% NaCl kemudian di vorteks. Sebanyak 0,1 mL sampel diambil kemudian dimasukkan ke dalam medium pertumbuhan MacConkey agar dengan

metode spread. Sampel diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37⁰ C. Isolat bakteri yang tumbuh pada medium pertumbuhan kemudian dipindahkan ke medium pertumbuhan baru dengan menggunakan metode goresan 4 kuadran untuk mendapatkan kultur murni. Tiap isolat murni lalu ditumbuhkan pada 2 agar miring pada tabung reaksi, satu kultur disimpan pada suhu 4⁰ C yang digunakan untuk kultur stok sedangkan yang lain digunakan untuk kultur kerja pada suhu 37⁰ C.

Pewarnaan gram bakteri

Sebelum dilakukan pengamatan mikroskopis, bakteri harus diwarnai terlebih dahulu dengan menggunakan pewarnaan gram. Isolat tunggal yang telah diperoleh dicuplik dengan menggunakan batang ose kemudian dibuat preparat keringnya. Preparat kering ditetes dengan kristal violet sebanyak 2-3 tetes dan didiamkan selama 1 menit kemudian dibilas dengan menggunakan air akuades. Setelah kering, preparat ditetes dengan larutan iodin dan dibiarkan selama 30 detik. Setelah itu, preparat dicuci dengan menggunakan air akuades. Lalu, preparat ditetes dengan larutan safranin dan dibiarkan selama 20 detik, dibilas kembali dengan air akuades. Preparat bakteri yang telah diwarnai kemudian diamati dibawah mikroskop dengan perbesaran 10x100 kali.

Uji resistensi antibiotik

Uji resistensi antibiotik terhadap isolat bakteri dilakukan dengan menggunakan antibiotik kanamycin, chloramphenicol, amoxycillin, tetracycline, ciprofloxacin, gentamicin, dan erythromycin dengan metode Kirby Bauer difusi kertas cakram. Bakteri ditumbuhkan pada medium nutrient agar dengan menggunakan metode spread. Selanjutnya, kertas cakram antibiotik diletakkan di atas permukaan medium yang telah diberi inokulan. Bakteri kemudian diinkubasi selama 14-16 jam dalam suhu ruang. Zona hambat yang telah terbentuk kemudian diukur. Interpretasi data zona hambat disesuaikan dengan standar zona hambat antibiotik dari *The Clinical & Laboratory Standards Institute*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penangkapan lalat di empat lokasi tempat sampah diperoleh total 12 (³¹) lalat. Lalat yang telah berhasil ditangkap kemudian dibawa ke laboratorium untuk dianalisis lebih lanjut. Dari proses isolasi bakteri, bakteri yang diperoleh berjumlah total 20 isolat. Karakteristik koloni isolat dapat dilihat pada tabel 1.

Analisis resistensi dilakukan menggunakan 7 macam antibiotik yaitu: kanamycin, chloramphenicol, amoxycillin, tetracycline, ciprofloxacin, gentamicin, dan erythromycin. Isolat bakteri yang telah diperoleh kemudian dianalisis ketahanannya terhadap 7 antibiotik tersebut. Antibiotik yang digunakan pada penelitian ini merupakan antibiotik yang umumnya direkomendasikan dalam pengobatan terhadap penyakit infeksi. Hasil uji antibiotik dapat diamati pada gambar 1. Dari ketujuh antibiotik yang digunakan, semua antibiotik merupakan antibiotik dengan spektrum luas kecuali amoxycillin yang memiliki spektrum sedang (¹⁴).


Zona hambat yang ditandai dengan terbentuknya zona bening disekitar kertas cakram (²⁵ mm) dengan menggunakan jangka sorong. Hasil pengukuran zona hambat kemudian ditabulasikan dan dibandingkan dengan standar pengukuran zona hambat antibiotik (³³) dari CLSI. Hasil interpretasi zona hambat dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 1. Karakteristik koloni isolat bakteri

Isolat	Bentuk Koloni	Permukaan Koloni	Tepi Koloni	Warna Koloni	Gram
L1	Sirkuler	Convex	Entire	Putih	Negatif
L2	Sirkuler	Convex	Entire	Putih	Negatif
L3	Irregular	Flat	Entire	Putih	Negatif
L4	Sirkuler	Convex	Entire	Putih	Negatif
L5	Sirkuler	Convex	Entire	Putih	Negatif
L6	Irregular	Flat	Entire	Putih	Negatif
L7	Irregular	Flat	Entire	Putih	Negatif
L8	Sirkuler	Convex	Entire	Putih	Negatif
L9	Sirkuler	Convex	Entire	Putih	Negatif
L10	Sirkuler	Convex	Entire	Putih	Negatif
L11	Sirkuler	Convex	Entire	Putih	Negatif
L12	Sirkuler	Convex	Entire	Putih	Negatif
L13	Sirkuler	Convex	Entire	Putih	Negatif
L14	Sirkuler	Convex	Entire	Putih	Negatif
L15	Irregular	Flat	Entire	Putih	Negatif
L16	Sirkuler	Convex	Entire	Putih	Negatif
L17	Sirkuler	Convex	Entire	Putih	Negatif
L18	Sirkuler	Convex	Entire	Putih	Negatif
L19	Sirkuler	Convex	Entire	Putih	Negatif
L20	Irregular	Flat	Entire	Putih	Negatif

Hasil interpretasi menunjukkan bahwa persentase resistensi tertinggi diperoleh pada uji antibiotik erythromycin yaitu sebesar 75%. Antibiotik dengan tingkat resistensi terendah yaitu antibiotik kanamycin, ciprofloxacin dan gentamicin yaitu sebesar 0%. Antibiotik dengan tingkat resistensi sedang yaitu pada antibiotic chloramphenicol, amoxicillin dan tetracyclin yaitu masing-masing 25%, 25% dan 50%. Tingkat resistensi yang berbeda dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya yaitu ada atau tidaknya gen pengkode resisten terhadap antibiotik tersebut (Bengtsson *et al*, 2018)

Antibiotik kanamycin masuk ke dalam golongan antibiotik aminoglikosida. Antibiotik ini merupakan antibiotik spektrum luas dimana efektif membunuh bakteri gram negatif dan beberapa bakteri gram positif. Antibiotik golongan ini bekerja menghambat sistesis protein dengan cara mengikat subunit 30S pada ribosom sehingga menyebabkan kesalahan baca kode genetik. Pada umumnya kasus resistensi pada golongan antibiotik ini disebabkan adanya inaktivasi menggunakan enzim.



Gambar 1. Uji resistensi antibiotik dengan menggunakan metode Kirby bauer (isolat bakteri a. L1 b. L3 c. L7 dan d. L14)

Tabel 2. Hasil Interpretasi Zona Hambat

	K	C	AML	TE	CIP	CN	E
L1	S	S	I	R	S	S	R
L2	S	R	R	S	S	S	R
L3	S	I	I	S	S	S	R
L4	S	S	S	R	S	S	S
L5	S	R	R	S	S	S	R
L6	S	I	I	S	S	S	R
L7	S	S	I	R	S	S	R
L8	S	S	S	R	S	S	S
L9	S	S	S	R	S	S	S
L10	S	S	I	R	S	S	R
L11	S	S	S	R	S	S	S
L12	S	R	R	S	S	S	R
L13	S	R	R	S	S	S	R
L14	S	I	I	S	S	S	R
L15	S	S	I	R	S	S	R
L16	S	S	I	R	S	S	R
L17	S	I	I	S	S	S	R
L18	S	S	S	R	S	S	S
L19	S	R	R	S	S	S	R
L20	S	I	I	S	S	S	R
Percentase (%)	0	25	25	50	0	0	75

Keterangan :

16

Antibiotik K : Kanamycin (30 μ g), C : Chloramphenicol (30 μ g), AML : Amoxicillin (25 μ g), TE : Tetracycline (30 μ g), CIP : Ciprofloxacin (30 μ g), CN : Gentamicin (30 μ g), E : Erythromycin (30 μ g).

S : Susceptible; I : Intermediat; R : Resistant
Interpretasi data zona hambat disesuaikan dengan standard zona hambat antibiotik dari *The Clinical & Laboratory Standards Institute*

Bakteri yang resisten terhadap kanamycin memiliki enzim untuk menginaktivasi aminoglikosida dengan cara memodifikasinya (Tsodikova, 2016). Antibiotik gentamycin merupakan antibiotik aminoglikosida, sama dengan antibiotik kanamycin. Pada penelitian ini, tidak ditemukan adanya resistensi isolat bakteri terhadap antibiotik kanamycin maupun gentamicin.

Antibiotik chloramphenicol merupakan antibiotik dengan spektrum luas karena memiliki efek bakteriosidal terhadap bakteri gram positif maupun negatif. Antibiotik ini

bekerja dengan cara mengikat protein subunit 50S pada ribosom bakteri sehingga dapat menghambat proses sintesis protein. Antibiotik ini dapat dipakai untuk pengobatan penyakit kolera, tipes dan lain-lain. Resistensi terhadap antibiotik ini dapat disebabkan oleh teraktivitasnya enzim detoksifikasi yaitu *chloramphenicol acetyltransferase* (CAT) (Schwarz *et al.*, 2004). Pada penelitian ini ditemukan 5 isolat telah resisten terhadap antibiotik chloramphenicol dengan persentase resistensi sebesar 25%.

Antibiotik amoxicillin merupakan golongan antibiotik beta-laktam. Mekanisme kerja antibiotik ini yaitu merusak dinding sel bakteri. Antibiotik ini merupakan antibiotik dengan spektrum 23 derat yaitu efektif dalam membunuh bakteri gram positif dan beberapa bakteri gram negatif diantaranya *Hemophilus influenzae*, *E.coli*, *Proteus mirabilis*, *Salmonella* sp., dan *Shigella* sp. (Werth., 2018).

Antibiotik tetracycline merupakan antibiotik dengan spektrum yang luas. Mekanisme kerja dari antibiotik ini yaitu mengikat protein subunit 30S pada ribosom sehingga menyebabkan protein sintesis terhambat. Resistensi terhadap antibiotik ini dapat disebabkan oleh beberapa mekanisme diantaranya yaitu keberadaan pompa tetracycline, ribosom bakteri terikat pada suatu protein sitoplasmik sehingga sisi pengikatan tetracycline akan terlindungi, modifikasi tetracycline, atau modifikasi 16S rRNA pada sisi pengikatan tetracycline. Berjalannya proses resistensi ini dibantu oleh lebih dari 20 grup protein di dalam sel bakteri (Li *et al.*, 2013).

Antibiotik ciprofloxacin merupakan antibiotik golongan 18 quinolone. Kinerja antibiotik ini adalah dengan cara menghambat kerja enzim topoisomerase II (DNA gyrase) dan topoisomerase IV yang berperan penting dalam sel bakteri pada proses DNA replikasi, transkripsi, dan lain-lain. Resistensi pada antibiotik ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti peningkatan pompa efflux, enzim modifikasi dan protein pelindung target. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa mekanisme resistensi ini bersifat tergantung pada spesies bakterinya (Redgrave *et al.*, 2014).

Antibiotik erythromycin merupakan antibiotik golongan makrolid. Antibiotik ini memiliki spektrum luas dimana bakteri ini bekerja dengan cara mengikat subunit 50S ribosom bakteri. Penggunaan antibiotik ini salah satunya adalah untuk pengobatan infeksi kulit. Resistensi terhadap antibiotik ini banyak terjadi pada *Streptococci*, salah satunya bakteri *Streptococcus pyogenes*. Selain itu, telah ada laporan resistensi antibiotik ini pada bakteri *Streptococcus pneumoniae*. Mekanisme resistensi pada antibiotik ini dapat disebabkan oleh adanya pompa erythromycin atau adanya metilasi pada 23S ribosom pada bakteri (Wasko *et al.* 2012).

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hampir semua isolat yang dianalisis pada penelitian ini resisten terhadap lebih dari satu macam antibiotik. Keadaan ini biasa dikenal dengan istilah *Multi-Drug Resistant* (MDR). Kasus MDR tentu saja sangat merugikan. Jika seseorang menderita penyakit infeksius yang disebabkan oleh bakteri MDR, pengobatan yang dilakukan akan lebih sulit. Hal ini dikarenakan opsi pengobatan dengan menggunakan antibiotik menjadi terbatas dan seringkali harus menggunakan antibiotik dengan resiko efek samping yang lebih tinggi.

Menurut Zhang *et al.*, (2018), lalat berpotensi dijadikan sebagai indikator penyebaran bakteri resisten antibiotik. Lalat dapat masuk ke banyak area ekosistem dan sangat dekat dengan kegiatan manusia. Penggunaan indikator ini lebih praktis dibandingkan analisis menggunakan sampel dari manusia dan hewan ternak yang seringkali memerlukan pemeriksaan dengan biaya yang cukup mahal dan lama.

SIMPULAN

Pada penelitian ini berhasil ditangkap 12 lalat dan diisolasi sebanyak 20 isolat bakteri. Persentase resistensi masing-masing isolat terhadap antibiotik yaitu kanamycin 0%, chloramphenicol 25%, amoxycillin 25%, tetracycline 50%, ciprofloxacin 0%, gentamicin 0%, dan erythromycin 75%.

REFERENSI

- Banjo, A.D., O.A. Lawal, & O.O. Adediji. (2005). Bacteria and fungi isolated from housefly (*Musca domestica* L.) larvae. *African Journal of Biotechnology*, 4(8): 780-784.
Bengtsson-Palme, Johan., Erik Kristiansson, dan D.G. Joakim Larsson. (2018). Environmental factors influencing the development and spread of antibiotic resistance. *FEMS Microbiology Reviews*, 42(1):68-80.
Buttler, J.F., A. Garcia-Maruniak, F. Meek, & J.E. Maruniak. (2010). Wild Florida house flies (*Musca domestica*) as carriers of pathogen bacteria. *Florida Entomologist*, 93(2): 218-223.
Fasanella, A., S. Scasciamacchia, G. Garafolo, A. Giangaspero, E. Tarsitano, & R. Adone. (2010). Evaluation of the house fly *Musca domestica* as a mechanical vector for an anthrax. *Plos One*, 5(8): 1-5.
Grubel, P., J.S. Hoffman, F.K. Chong, N.A. Burstein, C. Mepani, & D.R. Cave. (1997). Vector potential of houseflies (*Musca domestica*) for Helicobacter pylori. *Journal of Clinical Microbiology*, 35(6): 1300-1303.
Gupta, A.K., D. Nayduch, P. Verma, B. Shah, H.V. Ghate, M.S. Patole, & Y.S. Shouce. (2011). Phylogenetic characterization of bacteria in the gut of house flies (*Musca domestica* L.). *FEMS Microbiol. Ecol.*, 79: 581-593.
Hassiri, H., K. Akbarzadeh, & A. Ghaderi. (2012). Isolation of pathogenic bacteria on the house fly, *Musca domestica* L. (Diptera: Muscidae), body surface in Ahwaz hospitals, Southwestern Iran. *Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine*, 673-678.
Lamiaa, B., L. Mariam, & A. Ahmed. (2007). Bacteriological analysis of *Periplaneta americana* L. (Dictyoptera: Blattidae) and *Musca domestica* L. (Diptera: Muscidae) in ten district of Tangier, Morocco. *African Journal of Biotechnology*. 6(17): 2038-2042.

- 36
- Li, W., Gemma C. Atkinson , Nehal S. Thakor, Ular Allas, Chuao-chao Lu, Kwok-Yan Chan, Tanel Tenson, Klaus Schulten, Kevin S. Wilson, Vasili Hauriyliuk & Joachim Frank. (2013). Mechanism of Tetracycline Resistance by Ribosomal Protection Protein Tet(O). *Nat Commun.* 4:1477.
- Parathon, Harry., Kuntaman., Tri H. W., Bayu T. M., Anis K., Mariyatul Q., Zunilda D., Jihane F.T., Tjandra A., Visanu T., & Sirenda V. (2017). Progress toward antimicrobial resistance containment and control in Indonesia. *BMJ*, 358: j3828.
- Redgrave, Liam S., Sam, B.S., Mark A. W., & Laura J.V.P. (2014). Fluoroquinolone resistance : mechanisms, impact on bacteria, and role in evolutionary success. *Trends in Microbiology*. 22(8) : 438-445.
- 3
- Schwarz S, Kehrenberg C, Doublet B, & Cloeckaert A. (2004). Molecular basis of bacterial resistance to chloramphenicol and florfenicol. *FEMS Microbiol Rev.* 28(5) : 519-42. 13
- Tsodikova, Sylvie & Kristin J. Labby. (2016). Mechanisms of Resistance to Aminoglycoside Antibiotics : Overview and Perspective. *MedChemComm* 21(1) : 11-27.
- Vazirianzadeh, B., S.S. Solary, M. Rahdar, R. Hajhossien, & M. Mehdinejad, (2008). Identification of bacteria which possible transmitted by *Musca domestica* (Diptera: Muscidae) in the region of Ahvaz, SE Iran. *Jundishapur Journal of Microbiology*, 1(1): 28-31.
- Wasko, Adam, Katarzyna Skrzypczak, Magdalena Polak-Berecka & Adam Kuzdralinski. (2012). Genetic mechanisms of variation in erythromycin resistance in *Lactobacillus rhamnosus* strains. *The Journal of Antibiotics*, 65 29:3-586.
- Werth, Brian. (2018). Penicillin. MSD Manual Professional Version. (Online), (<http://www.msmanuals.com>), diakses 12 Agustus 2019.
- Zhang, J., Jiawei W., Li Chen., Afrah K.Y., Patrick K., Patrick B., Jing Li., Janssen G., Russel C., 6ezong Q. & Chengming W. (2018). Housefly (*Musca domestica*) and Blow Fly (*Protophormia terraenovae*) as vectors of bacteria carrying colistin resistance genes. *Applied and Environmental Microbiology*. 84(1): e01736-17.

HASIL CEK-2 Quagga Bakteri lalat

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

RANK	SOURCE	TYPE	SIMILARITY (%)
1	idoc.pub	Internet Source	1%
2	Submitted to Coventry University	Student Paper	1%
3	Submitted to University of Hull	Student Paper	1%
4	repositori.uin-alauddin.ac.id	Internet Source	1%
5	onlinelibrary.wiley.com	Internet Source	1%
6	orca.cf.ac.uk	Internet Source	1%
7	hdl.handle.net	Internet Source	1%
8	Submitted to University of Florida	Student Paper	1%
9	sites.kowsarpub.com	Internet Source	1%

10	www.academie-medecine.fr Internet Source	1 %
11	Aldhiani Santrianda, Oktira Roka Aji. "Pengendalian Parasit Trichodina sp. Menggunakan Infusa Daun Jambu Biji (<i>Psidium guajava L.</i>) pada Permukaan Kulit Ikan Lele (<i>Clarias batrachus L.</i>)", Biosel: <i>Biology Science and Education</i> , 2021 Publication	1 %
12	Mehdi Rashki Ghalehnoo. "Housefly (<i>Musca domestica</i>) as Carrier of Enterotoxigenic <i>Staphylococcus aureus</i> in Broiler Farms in Iran: Is it Important for Public Health?", <i>International Journal of Enteric Pathogens</i> , 2015 Publication	1 %
13	Submitted to University of Salford Student Paper	1 %
14	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
15	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	<1 %
16	Noémi Nógrády, Judit Pászti, Henriett Pikó, Béla Nagy. " Class 1 integrons and their conjugal transfer with and without virulence-	<1 %

associated genes in extra-intestinal and intestinal of poultry ", Avian Pathology, 2007

Publication

-
- 17 Submitted to Sriwijaya University <1 %
Student Paper
-
- 18 de.scribd.com <1 %
Internet Source
-
- 19 hardiyanti1992.wordpress.com <1 %
Internet Source
-
- 20 Hiroaki Kunogi, Nanae Yamaguchi, Keisuke Sasai. "Evaluation of a new bi-valve vaginal speculum applicator design for gynecologic interstitial brachytherapy", Journal of Contemporary Brachytherapy, 2020 <1 %
Publication
-
- 21 bioone.org <1 %
Internet Source
-
- 22 media.neliti.com <1 %
Internet Source
-
- 23 nissa-uchil.blogspot.com <1 %
Internet Source
-
- 24 Ahmad Thalib. "Isolasi bakteri yang terdapat pada kulit udang", Agrikan: Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan, 2011 <1 %
Publication
-

- Internet Source **25** <1 %
-
- Internet Source **26** ejurnal.bunghatta.ac.id <1 %
-
- Internet Source **27** mts.intechopen.com <1 %
-
- Student Paper **28** Submitted to College of Professional and Continuing Education (CPCE), Polytechnic University <1 %
-
- Publication **29** Sayo Matsuoka, Satoko Hori, Hiroki Satoh, Takeshi Nagamatsu, Tomoyuki Fujii, Yasufumi Sawada. "Quantitative prediction of fetal plasma concentration of fluvoxamine during dosage-tapering to the mother", Placenta, 2017 <1 %
-
- Internet Source **30** academicjournals.org <1 %
-
- Internet Source **31** es.scribd.com <1 %
-
- Internet Source **32** www.jurnal.unsyiah.ac.id <1 %
-
- Internet Source **33** www.neliti.com <1 %

34	209.238.2.121 Internet Source	<1 %
35	krex.k-state.edu Internet Source	<1 %
36	www.nature.com Internet Source	<1 %
37	nepis.epa.gov Internet Source	<1 %
38	www.southcentre.int Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches Off