

PENGESAHAN SKRIPSI
Berjudul

POLA PENGGUNAAN OBAT PADA PASIEN REHABILITASI
PENYALAHGUNAAN NAPZA DI RSPA
DR. S. HARDJOLUKITO YOGYAKARTA
PERIODE JANUARI 2021 - DESEMBER 2021


Oleh:
Ina Ulfa Dila
1900023221

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi
Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan
Pada tanggal:

Mengetahui
Fakultas Farmasi
Universitas Ahmad Dahlan

Pembimbing Utama

apt. Imaniar Noor Faridah S.Farm, M.Sc



Dr. apt. Iis Wahyuningih, M.Si

Penguji:

1. apt. Imaniar Noor Faridah S.Farm, M.Sc
2. apt. Susan Fitria Candraewi S.Farm, M.Sc
3. apt. Prita Anggarini Kartika Sari S.Farm, M.Farm

INTISARI

Penyalahgunaan NAPZA memberikan dampak negatif yang besar pada perkembangan kesehatan dan sosial ekonomi, bukan hanya bagi pribadi penyalahguna namun juga hubungan keluarga, lingkungan, bahkan negara. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya dalam menghentikan penyalahgunaan, mengurangi frekuensi, mengurangi keparahan kambuh dan memulihkan fisik. Terapi medis yang diberikan pada pasien rehabilitasi yaitu terapi terhadap keadaan intoksikasi, kelebihan dosis dan putus zat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis NAPZA dan gambaran pola penggunaan obat pada pasien rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. S. Hardjolukito Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif non eksperimental dengan pengambilan data secara retrospektif. Kriteria inklusi yaitu pasien dengan riwayat penyalahgunaan NAPZA dengan kode ICD F45 / F19 dan pasien yang terdaftar rawat inap atau rawat jalan periode 1 Januari sampai 31 Desember 2021. Data diperoleh dari rekam medis pasien di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. S. Hardjolukito Yogyakarta. Selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif.

Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 125 pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pasien didominasi oleh laki-laki sebanyak 116 orang (92,80%), usia 17 – 25 tahun 74 orang (59,20%), pendidikan terakhir SLTA sebanyak 89 orang (71,20%), status belum nikah 79 orang (63,20%) dan kategori masa rehabilitasi lama 69 orang (55,20%). Jenis NAPZA yang banyak disalahgunakan yaitu sabu dengan keluhan cemas dan susah tidur. Golongan obat yang banyak diresepkan yaitu benzodiazepine 125 pasien (81,17%) dengan jenis alprazolam 85 (68,00%) dan dosis 1mg sebanyak 124 (70,45%).

Dapat disimpulkan bahwa jenis NAPZA yang disalahgunakan yaitu psikotropika golongan II dan narkotika golongan I serta gambaran pola pengobatan yang dimulai dengan regimen obat golongan benzodiazepine.

Kata kunci : Penyalahgunaan, Rehabilitasi, Terapi

ABSTRACT

Drug abuse has a major negative impact on health and socio-economic development, not only for individual abusers but also for family relationships, the environment, and even the country. Rehabilitation is an effort to stop protection, reduce frequency, reduce the severity of recovery and recover physically. Medical therapy given to rehabilitation patients is therapy for intoxication, overdosage and substance deficiency. This study aims to determine the types of drugs and describe patterns of drug use in Narcotics rehabilitation patients at the Central Air Force Hospital, dr. S. Hardjolukito Yogyakarta.

This research is a non-experimental descriptive study with retrospective data collection. The inclusion criteria were patients with a history of drug tracking with ICD code F45 / F19 and patients who were registered as inpatients or outpatients for the period January 1 to December 31 2021. Data were obtained from patient medical records at Dr. Air Force Central Hospital. S. Hardjolukito Yogyakarta. Furthermore, the data obtained will be analyzed descriptively. The number of samples in this study were 125 patients. The results showed that the characteristics of the patients were dominated by men as many as 116 people (92.80%), aged 17-25 years 74 people (59.20%), graduated high school as many as 89 people (71.20%), status not yet married 79 people (63.20%) and the category of long rehabilitation period 69 people (55.20%). The type of drug that is widely abused is methamphetamine with complaints of anxiety and insomnia. The most prescribed class of drugs were benzodiazepines in 125 patients (81.17%) with alprazolam in 85 (68.00%) and 1mg dose in 124 (70.45%).

It can be interpreted that the types of drugs that are abused are group II psychotropics and class I narcotics and a description of the pattern of treatment that starts with a benzodiazepine class drug regimen.

Keywords: Abuse, Rehabilitation, Therapy